

CONSULTA DE PREVENCIÓN DE TUMORES DIGESTIVOS

INFORME DE VIGILANCIA DE POLIPOS COLORRECTALES

Etiqueta del malalt

Recientemente se le ha realizado una colonoscopia en nuestro Centro, donde se ha(n) identificado y reseado el(los) siguiente(s) pólipo(s):

En la actualidad está bien establecido que las personas que han presentado un pólipo tienen una mayor probabilidad de desarrollar nuevas lesiones colorrectales en el futuro, motivo por el que se recomienda efectuar una vigilancia mediante colonoscopia. La probabilidad de desarrollar nuevas lesiones viene condicionada por el número, tamaño y características histológicas de los pólipos, y en función de estos factores se decide la periodicidad de las exploraciones. Sin embargo, no existen evidencias sólidas que apoyen en qué momento debe hacerse esta colonoscopia. En este sentido, usted ha aceptado participar en un estudio que compara diferentes intervalos de vigilancia (**estudio EPOS**). Según este estudio su colonoscopia de vigilancia se efectuará:

Próxima colonoscopia: 5 y 10 años

Las recomendaciones de vigilancia de los pólipos colorrectales van dirigidas a personas asintomáticas. La aparición de síntomas durante el intervalo propuesto tendrá que ser comunicada a su médico, quien puede considerar necesario modificar dicho intervalo.

Ante cualquier duda, póngase en contacto con nosotros.

Cordialmente

Dr. Rodrigo Jover

19/06/19

¹Guía de Prevención del Cáncer Colorrectal de la Asociación Española de Gastroenterología (www.guiasgastro.net).

²Guidelines for colonoscopy surveillance after polypectomy: a consensus update by the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer and the American Cancer Society.

³European Guideline for quality assurance of colorectal cancer screening.